Analyse von CYP450-Wechselwirkungen: kleiner Aufwand, große Wirkung

Das Interaktionspotenzial konventioneller Zytostatika

Holger Petri, Bad Wildungen*

Bei gleicher Dosis antineoplastischer Arzneimittel kann das individuelle Ansprechen hinsichtlich klinischer Wirksamkeit und Verträglichkeit stark variieren. Unterschiedliche Plasmaspiegel einzelner Zytostatika und ihrer Metaboliten sind auch abhängig von der Funktionalität der Cytochrom-P450(CYP)-Isoenzyme. In der Interaktionstabelle (Tab. 1) wird das Verhalten häufig eingesetzter Krebsmittel zu den CYP-Enzymen dargestellt.

Psychopharmakotherapie 2017;24:231–4.

Cyclophosphamid

Cyclophosphamid ist ein Prodrug. An der Bioaktivierung und an der Detoxifikation sind Cytochrom-P450(CYP)-Isoenzyme maßgeblich beteiligt. Das polymorph exprimierte Enzym CYP2B6 hat den größten Anteil an der Bildung des aktiven Metaboliten 4-Hydroxycyclophosphamid, das weiter zum letztlich zytotoxischen Phosphoramidlost abgebaut wird. Über CYP3A4 findet primär die Detoxifikation statt [4]. Modulatoren dieser beiden Isoenzyme können somit Einfluss auf die Wirksamkeit und Verträglichkeit einer Cyclophosphamid-Therapie haben. Carbamazepin und Phenytoin sind Induktoren von CYP2B6 und 3A4 (Abb. 1). Bei einem Patienten unter Hochdosischemotherapie verursachte Carbamazepin an Tag 1 einen Anstieg der AUC (Fläche unter der Konzentrations-Zeit-Kurve) von 4-Hydroxycyclophosphamid um 58% [7]. In einem anderen Fallbericht steigerte Phenytoin die Bildung von 4-Hydroxycyclophosphamid um 51% und die maximale Plasmakonzentration war um 600% erhöht. In der Konsequenz wurde die Absolutdosis von Cyclophosphamid von 2835 mg auf 1500 mg gesenkt, ohne dass sich dies negativ auf den Behandlungserfolg ausgewirkt hätte [5].

5-Fluorouracil und Capecitabin

Der Antimetabolit 5-Fluorouracil und sein Prodrug Capecitabin sind potente Hemmer von CYP2C9. Das Antikonvulsivum Phenytoin wird primär über CYP2C9 abgebaut. Die Kombination mit den beiden Antimetaboliten führte in Fallberichten bis zu einem vierfachen Anstieg der Phenytoin-Exposition mit hieraus folgenden Intoxikationen [2]. Auch Vitamin-K-Antagonisten wie Warfarin sind Substrate von CYP2C9. Die beiden Fluoropyrimidine können die Antikoagulanzen-Plasmaspiegel und somit das Blutungsrisiko erhöhen [11]. Andere Substrate von CYP2C9 sind die Sulfonylharnstoff-Antidiabetika Glibenclamid und Glimperid [17]. Es besteht die Gefahr von Hypoglykämien. 5-Fluorouracil wird CYP-unabhängig über das polymorphe Enzym Dihydropyrimidinehydrogenase (DPD) abgebaut [14].

Irinotecan

Der Topoisomerase-I-Inhibitor Irinotecan wird zu etwa 3% über Carboxylesterasen zum Metaboliten SN-38 verstoffwechselt, dessen antineoplastische Aktivität 100- bis 1000-mal höher ist als die seiner Muttersubstanz. SN-38 wird weiter über die Uridin-5'-diphosphat-Glucuronosyltransferase

(UGT) 1A1 abgebaut. Andere inaktive Metaboliten werden über CYP3A4 gebildet [20].

Ketoconazol ist ein starker Inhibitor von CYP3A4 (Abb. 1) und hemmt UGT1A1 [23]. Ketoconazol verminderte in einer Studie die AUC des über CYP3A4 gebildeten oxidativen Hauptmetaboliten APC um 87%, während die AUC von SN-38 um 109% erhöht war [12]. Johanniskraut induziert CYP3A4 und UGT1A1. In einer Interaktionsstudie mit fünf Patienten senkte Johanniskraut die Plasmakonzentration von SN-38 um 42% und sollte daher in Kombination mit Irinotecan vermieden werden [13].

Eine auf dem CYP3A4-Phänotyp basierende Dosisadjustierung von Irinotecan führte in einer Untersuchung zu einem selteneren Auftreten schwerer Neutropenien und Blutbildstörungen [20].

*Nachdruck aus *Krankenhauspharmazie* 2017;38:434–7.

Der Artikel wurde unter Einbeziehung von Diskussionsbeiträgen von Dr. Jörg Brüggmann, Berlin, Prof. Dr. Christoph Hiemke, Mainz, und Dr. Jochen Weber, Bad Wildungen, erstellt.

Holger Petri, Zentral-Apotheke der Wicker Kliniken, Im Kreuzfeld 4, 34537 Bad Wildungen, E-Mail: hpetri@werner-wicker-klinik.de

Docetaxel und Paclitaxel

Docetaxel wird durch CYP3A4 metabolisiert. Der starke CYP3A4-Inhibitor Ketoconazol senkte in einer Studie mit sieben Patienten die Docetaxel-Clearance um 49% [8]. Die Hemmung des Abbaus von Docetaxel durch Ritonavir wird für schwerwiegende Nebenwirkungen des Taxans bei drei HIV-Patienten verantwortlich gemacht [15]. In einem Tierversuch erhöhte sich die AUC von Docetaxel durch Ritonavir und Ketoconazol um das 6,9- bzw. 3,1-Fache. CYP3A4-Induktoren wie Dexamethason und Efavirenz blieben ohne nennenswerten Effekt auf pharmakokinetische Parameter [19]. In einer Studie mit Johanniskraut sank die AUC in Kombination mit Docetaxel um 12% [9].

Paclitaxel wird primär über CYP2C8 und nachgeordnet über CYP3A4 abgebaut. Das Nebenwirkungsprofil ist bei gleichzeitiger Medikation von CYP2C8-Inhibitoren verschlechtert. Beispielsweise verdoppelt der Glucuronid-Metabolit von Clopidogrel als potenter CYP2C8-Inhibitor das Risiko für schwerwiegende periphere Neuropathien und Blutbildstörungen bei einer höheren Taxandosis [1]. CYP3A4-hemmende Proteasehemmer führten in einer Pilotstudie zu einer erhöhten Paclitaxel-Exposition. Hierdurch wurden aber weder Verträglichkeit noch Wirksamkeit beeinflusst [3].

Vinca-Alkaloide

Vinca-Alkaloide wie Vincristin und Vinorelbin werden über CYP3A4 verstoffwechselt [18]. Die Komedikation von Azol-Antimykotika, mit Ausnahme von Fluconazol, führt bei Patienten unter Vincristin-Therapie häufiger zu schweren neurotoxischen Nebenwirkungen. Die CYP3A4-hemmende Potenz von Fluconazol ist schwächer ausgeprägt als die anderer Azole [16]. Die CYP3A4-induzierenden Antikonvulsiva Carbamazepin und Phenytoin senken die AUC von Vincristin durchschnittlich um 43% [22].

CYP3A5 hat in vitro einen größeren Anteil am Abbau von Vincristin als CYP3A4 [18]. Es gibt Hinweise, dass

Patienten, die CYP3A5 exprimieren, ein niedrigeres Risiko neurotoxischer Nebenwirkungen aufweisen [6]. In der mitteleuropäischen Bevölkerung sind zum Teil über 90% Träger von Genen, die für funktionsdefiziente Enzyme kodieren [21]. In einer Untersuchung mit pädiatrischen Patienten ließ sich kein Zusammenhang feststellen zwischen dem Polymorphismus von CYP3A5 und dem Vincristin-Plasmaspiegel [10]. Welchen Einfluss CYP3A5-bedingte Interaktionen auf den Vincristin-Plasmaspiegel haben, bleibt somit noch zu klären.

Fazit

Der Stoffwechsel über CYP-Enzyme ist für den Metabolismus zahlreicher konventioneller Zytostatika von Bedeutung. Der Toxizität der Substanzen ist es geschuldet, dass Daten aus klassischen Interaktionsstudien in der Regel mit gesunden, jungen Probanden fehlen. Die Übertragbarkeit der aus In-vitro- und Tierstudien gewonnenen Erkenntnisse auf den Menschen ist nicht ohne Weiteres möglich. Alternativ können In-vivo-Studien mit Patienten und Kasuistiken nützliche Hinweise zu potenziell klinisch relevanten Interaktionen bieten. Hierzu ist es notwendig, die Literatur auf diesbezügliche Signale fortlaufend zu beobachten. Für die in diesem Beitrag nicht beschriebenen konventionellen Zytostatika gilt bei der Bewertung CYP-bedingter Interaktionen in Analogie die Fragestellung, welche Bedeutung die Metaboliten für Wirkung und Verträglichkeit haben. Nicht zuletzt spielen zahlreiche weitere Vorgänge in der Biotransformation (Phase-II-Reaktionen, Verteilung durch Arzneimitteltransporter) eine Rolle, sodass zu jeder individuellen Therapie aufgrund der Schwere der Erkrankung eine Interaktionsprüfung obligat ist.

Literatur

1. Agergaard K, Mau-Sørensen M, Stage TB, et al. Clopidogrel-paclitaxel drug-drug interaction: a pharmacoepidemiologic study. *Clin Pharmacol Ther* 2017 Feb 22 doi: 10.1002/cpt.674.
2. Brickell K, Porter D, Thompson P. Phenytoin toxicity due to fluoropyrimidines (SFU/capecitabine): three case reports *Br J Cancer* 2003;89:615–6.

3. Cianfrocca M, Lee S, Von Roenn J, et al. Pilot study evaluating the interaction between paclitaxel and protease inhibitors in patients with human immunodeficiency virus-associated Kaposi's sarcoma: an Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) and AIDS Malignancy Consortium (AMC) trial. *Cancer Chemother Pharmacol* 2011;68:827–33.
4. De Jonge ME, Huitema ADR, Rodenhuis S, et al. Clinical pharmacokinetics of cyclophosphamide, *Clin Pharmacokinet* 2005;44:1135–64.
5. De Jonge ME, Huitema ADR, van Dam SM, et al. Significant induction of cyclophosphamide and thiotepa metabolism by phenytoin. *Cancer Chemother Pharmacol* 2005;55:507–10.
6. Egbelakin A, Ferguson MJ, MacGill EA, et al. Increased risk of vincristine neurotoxicity associated with low CYP3A5 expression genotype in children with acute lymphoblastic leukemia. *Pediatr Blood Cancer* 2011;56:361–7.
7. Ekhardt C, Rodenhuis S, Beijnen JH, et al. Carbamazepine induces bioactivation of cyclophosphamide and thiotepa. *Cancer Chemother Pharmacol* 2009;63:543–7.
8. Fachinformation Taxotere®. Stand: Mai 2017.
9. Goey AK, Meijerman I, Rosing H, et al. The effect of St John's wort on the pharmacokinetics of docetaxel. *Clin Pharmacokinet* 2014;53:103–10.
10. Guilhaumou R, Simon N, Quaranta S, et al. Population pharmacokinetics and pharmacogenetics of vincristine in paediatric patients treated for solid tumour diseases. *Cancer Chemother Pharmacol* 2011;68:1191–8.
11. Gunes A, Coskun U, Boruban C, et al. Inhibitory effect of 5-fluorouracil on cytochrome P450 2C9 activity in cancer patients. *Basic Clin Pharmacol Toxicol* 2006;98:197–200.
12. Kehrer DF, Mathijssen RH, Verweij J, et al. Modulation of irinotecan metabolism by ketoconazole. *J Clin Oncol* 2002;20:3122–9.
13. Mathijssen RH, Verweij J, de Bruijn P, et al. Effects of St. John's wort on irinotecan metabolism. *J Natl Cancer Inst* 2002;94:1247–9.
14. Mazza F, Borro M, Botticelli A, et al. Pre-treatment evaluation of 5-fluorouracil degradation rate: association of poor and ultra-rapid metabolism with severe toxicity in a colorectal cancer patients cohort. *Oncotarget* 2016;7:20612–20.
15. Mir O, Dessard-Diana B, Louet AL, et al. Severe toxicity related to a pharmacokinetic interaction between docetaxel and ritonavir in HIV-infected patients. *Br J Clin Pharmacol* 2010;69:99–101.
16. Moriyama B, Henning SA, Leung J, et al. Adverse interactions between antifungal azoles and vincristine: review and analysis of cases. *Mycoses* 2012;55:290–7.
17. Petri H. Das Interaktionspotenzial der oralen Antidiabetika. *Krankenhauspharmazie* 2017;38:42–6.
18. PharmGKB. Vinka Alkaloid Pathway, Pharmacokinetics. <https://www.pharmgkb.org/pathway/PA150981002> (Zugriff 18.07.2017).

Tab. 1. Übersicht der Cytochrom-P450-assoziierten Interaktionen konventioneller Chemotherapeutika

Substanz (Beispiel für Handelspräparat)	CYP450: Metabolisierung und modulierende Wirkungen ^I	Interaktion durch CYP450- Modulatoren	Inter- aktions- risiko*	Bemerkungen	Pharmakogenetik ^{II}
5-Fluorouracil (Ribofluor), Capecitabin (Xeloda)	Mittelstarker Inhibitor von CYP2C9	Nicht bekannt		Abbau über das polymorph exprimierte Enzym Dihydropyrimidindehydrogenase (DPD).	CYP2B6: Bei Allelträgern mit den Varianten CYP2B6*5, *6, *18 (Häufigkeit 6–25%) ist die Expression und Aktivität des Enzyms vermindert. Bei den Varianten CYP2B6*4 und *22 gesteigert.
Cyclophosphamid (Endoxan)	Substrat von CYP2B6 Substrat von CYP3A4	CYP2B6-Inhibitoren und -Induktoren CYP3A4-Inhibitoren und -Induktoren			CYP3A5: 85% der Mitteleuropäer sind PM (Poor metabolizer) für CYP3A5, bei Asiaten sind es 70% und bei Afrikanern 50%.
Docetaxel (Taxotere)	Substrat von CYP3A4	CYP3A4-Inhibitoren und -Induktoren
Irinotecan (Campto)	Substrat von CYP3A4	CYP3A4-Inhibitoren und -Induktoren		Wirksamer Metabolit ist SN-38. SN-38 ist Substrat von UGT1A1.	
Paclitaxel (Taxol)	Substrat von CYP2C8	CYP2C8-Inhibitoren und -Induktoren
Vinca-Alkaloide: Vincristin (Vincristin-Hexal) und Vinorelbin (Navelbine)	Substrat von CYP3A4	CYP3A4-Inhibitoren und -Induktoren		In vitro wird Vincristin zu einem größeren Anteil über CYP3A5 abgebaut.	

*Unabhängig des Risikos für CYP-bedingte Interaktionen ist aufgrund der Schwere der Erkrankung eine Prüfung auf Wechselwirkungen obligat.

Vor einer Kombinationstherapie ist die Anwendung eines Interaktionsprogramms unverzichtbar!

Vor einer Kombinationstherapie ist die Anwendung eines Interaktionsprogramms zu empfehlen.

Es gibt mehrere klinisch bedeutsame Interaktionen.
Die Anwendung eines Interaktionsprogramms ist ratsam.

Es sind vereinzelte Interaktionen zu beachten.

Die aufgeführten Daten bewerten allein die Eigenschaften der Substanzen auf Ebene der Metabolisierung über Cytochrom-P450-Isoenzyme. Da Interaktionen nur im klinischen Kontext richtig interpretiert werden können, ist es offensichtlich, dass die Interaktionstabelle keine eindeutigen Schlüsse zulässt, sondern lediglich wichtige Hinweise vermittelt^{II}. Eine pharmakologische Bewertung, beispielsweise hinsichtlich Wirksamkeit, Zulassungsstatus oder Kontraindikationen, bleibt mit Ausnahmen (siehe Spalte „Bemerkungen“) unberücksichtigt.

Quellen: I: mediQ-Interaktionsprogramm, Haupt- und relevante Abbauewege (Stand 8/2017); II: Benkert O, et al. Kompendium der Psychiatrischen Pharmakotherapie, 10. Aufl. Heidelberg: Springer Medizin Verlag, 2014; III: Masche U, et al. Zytochrome und andere Proteine und ihre Bedeutung für pharmakokinetische Arzneimittelinteraktionen. 4. Auflage, Wli: Infomed-Verlags AG, 2009.

Abb. 1. Auswahl von modulierenden Substanzen (stark wirkende fettgedruckt) mit klinisch relevanter Wirkung auf Cytochrom P450 (CYP) 2B6, 2C8 und 3A4 (Stand: 8/2017) [Quelle: mediQ-Interaktionsprogramm]

19. Rudek MA, Chang CY, Steadman K, et al. Combination antiretroviral therapy (cART) component ritonavir significantly alters docetaxel exposure. *Cancer Chemother Pharmacol* 2014;73:729–36.

20. Van der Bol JM, Mathijssen RH, Creemers GJ, et al. A CYP3A4 phenotype-based dosing algorithm for individualized treatment of irinotecan. *Clin Cancer Res* 2010;16:736–42.

21. Van Schaik RH, van der Heiden IP, van den Anker JN, et al. CYP3A5 variant allele frequencies in Dutch Caucasians. *Clin Chem* 2002;48:1068–71.

22. Villikka K, Kivistö KT, Mäenpää H, et al. Cytochrome P450-inducing antiepileptics increase the clearance of vincristine in patients with brain tumors. *Clin Pharmacol Ther* 1999;66:589–93.

23. Yong WP, Ramirez J, Innocenti F, et al. Effects of ketoconazole on glucuronidation by UDP-glucuronosyltransferase enzymes. *Clin Cancer Res* 2005;11:6699–704.